

PRF-behandeling van een zenuw

Deze behandeling houdt in dat een naald, eventueel onder röntgendoorlichting, bij een zenuw wordt geplaatst. Met een bepaald soort stroom wordt via deze naald de zenuw behandeld, waardoor een langdurig pijnstillend effect kan optreden. In deze brochure vindt u meer informatie over deze behandeling.

Voorzorgsmaatregelen

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts vóór het onderzoek:

- U gebruikt bloedverdünnende medicijnen.
- U bent mogelijk zwanger.
- U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters.

De dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats in DC|Pijncentrum. U kunt zich melden bij de receptie. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U neemt, eventueel met uw begeleider, plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan de begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Rekent u op een verblijf van ongeveer een uur.

De behandeling

U gaat op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats waar de behandeling wordt gedaan, ligt u op

uw buik of uw rug. De naald wordt, eventueel onder röntgendoorlichting, geplaatst bij de zenuw. Hierna geven we gedurende 2 minuten een kloppende stroom via de naald aan de zenuw. Dit hoort niet pijnlijk te zijn, maar als het onaangenaam is kunnen we de zenuw verdoven.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling wordt u op een bed op de verkoeverkamer gelegd en na 15 minuten bespreekt de pijnspecialist met u wanneer hij u wil terugzien voor controle.

Complicaties/bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een RF of PRF-behandeling van een zenuwwortel optreden:

- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeding ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn.
- Het kan 1-2 weken duren voordat het effect waarneembaar wordt.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. De eerste twee weken na de behandeling kunnen uw pijnklachten verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt eventueel pijnstillers innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden. Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Vragen?

Als u vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen op tel. (036) 548 2160.

Tot slot

Wij doen er alles aan uw bezoek aan DC|Pijncentrum zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij dit graag. Heeft u vragen n.a.v. deze informatie of het onderzoek, stelt u die dan gerust. Wanneer u een klacht heeft kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris, tel. (070) 330 1209. Hij/zij vraagt wat u wilt dat er met uw klacht gebeurt. Dat kan een bemiddelingsgesprek inhouden of het vragen van een reactie van de persoon op wie uw klacht betrekking heeft. U kunt ook besluiten om uw klacht door de klachtencommissie te laten behandelen. De klachtenfunctionaris kan u over elk van deze stappen verder informeren.


Patiëntinformatie PRF-behandeling van een zenuw

Trein

NS station Almere Muziekwijk

Bus

Stadsbus 4 (vanuit Almere Stad)



DC|Pijncentrum Almere

Bartokweg 161
1311 ZX Almere
tel. (036) 548 2160
fax (036) 548 2161

almere@diagnostischcentrum.com
www.diagnostischcentrum.com

Indien er na ontslag complicaties optreden kunt u bellen met DC|Almere.
Het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 16.30 uur.

