

Patiëntinformatie Colonoscopie



Colonoscopie

Polikliniek / dagopname

Vorbereidingen thuis: Via Moviprep®


Datum onderzoek:

Onderzoek in de ochtend middag

Wat is een colonoscopie?

Op advies van uw behandelend arts zult u een colonoscopie ondergaan. Een colonoscopie is een onderzoek waarbij de dikke darm heel nauwkeurig op de aanwezigheid van afwijkingen wordt geïnspecteerd.

Dit gebeurt met behulp van een videocameraatje dat in een lange, dunne en buigzame slang is ingebouwd. Een dergelijk instrument heet een endoscoop.



Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Om overlast te voorkomen, krijgt u vlak voor het onderzoek een slaapmiddel toegediend via een infuusnaaldje in uw arm. Soms wordt bij dit onderzoek gelijktijdig ook een behandeling toegepast, bijvoorbeeld het verwijderen van eventueel aanwezige poliepen.

Het onderzoek wordt verricht door een maag-lever-darmarts. Dit is een ervaren specialist, die daarvoor een specifieke opleiding heeft genoten.

Belangrijke informatie

Stoppen met het innemen van onderstaande medicamenten doet u altijd in overleg met de arts die deze medicatie heeft voorgeschreven óf de arts die het onderzoek aanvraagt. U dient zijn/haar adviezen bij de voorbereidingen voor het onderzoek op te volgen! Als u doorgaat met één van deze medicijnen, moet u dit altijd melden aan de arts die de colonoscopie bij u verricht.

Neem voor de ingreep contact op met uw behandelend arts en bespreek hoe u moet omgaan met medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden.

Wanneer u staaltabletten (ijzertabletten) gebruikt, moet u hier 10 dagen voor het onderzoek mee stoppen. Deze middelen kunnen namelijk een zwarte verkleuring van de darmen afgeven, waardoor de beelden onduidelijk worden.

Geneesmiddel dokter	Altijd melden aan die onderzoek doet!
Sintrom; acenocoumarol	<i>Overleg behandelend arts</i>
Plavix	<i>Overleg behandelend arts</i>
Marcoumar; Fenprocoumon	<i>Overleg behandelend arts</i>
Ascal	<i>Altijd doorgaan</i>

Heeft u diabetes? Neem dan contact op met uw behandelend arts en vraag hoe u de medicatie moet toepassen. Geef tijdens het intakegesprek aan wat de eventuele veranderingen zijn.

Belangrijk voor mensen met een stoma

Indien u een colostoma heeft, raden wij u dringend aan voor het innemen van de laxeremiddelen opvangmateriaal te gebruiken dat u kunt legen. Wanneer u niet in het bezit bent van een dergelijk stomazakje, kunt u dit ophalen bij uw stomaverpleegkundige.

De voorbereidingen

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het belangrijk om voorafgaand aan het onderzoek de darm zo goed mogelijk schoon te maken. Hiervoor zijn ook voorbereidingen thuis noodzakelijk.

Vanaf 4 dagen voor het onderzoek mag u geen pithoudende vruchten en meergranen brood eten (de pitjes/granen kunnen het instrument verstoppen).

Colonoscopie in de ochtend:

Volg de voorbereidingen op deze pagina.

De dag vóór het onderzoek, te wetendag:

Wij verzoeken u na de lunch alleen yoghurt, vla en bouillon te gebruiken. Ook mag u koffie, thee en koolzuurhoudend bronwater gebruiken; echter geen vruchtensappen of andere suiker- dan wel gesuikerde koolzuurhoudende dranken.

Om 16:00 uur neemt u 2 tabletten Bisacodyl® in.
(Houdt u er rekening mee dat Bisacodyl® een laxerend middel is!)

Om 20:00 uur opent u de verpakking van Moviprep®

- Voeg sachet A en B samen in een maatbeker van 1 liter
- Giet vervolgens 1 liter water in de maatbeker en roer tot de poeder is opgelost en de vloeistof helder is (dit kan 5 minuten duren)
- Drink iedere 15 minuten 1 glas van de klaargemaakte vloeistof

Het is belangrijk dat u na het starten (aanvullend op de Moviprepoplossing) veel drinkt. Echter alleen heldere en suikervrije vloeistoffen, bijv. mineraalwater (minimaal 1 liter extra).

Vanaf nu mag u niets meer eten!

Koffie (zonder suiker en melk), thee en koolzuurhoudend bronwater mag wel. Géén vruchtensappen of andere suiker-dan wel gesuikerde koolzuurhoudende dranken.

De dag van het onderzoek, te wetendag:

Om 07:00 uur opent u de tweede verpakking van de MoviPrep® en neemt u sachet A en B eruit.

- Voeg sachet A en B samen in een maatbeker van 1 liter.
- Giet vervolgens 1 liter water in de maatbeker en roer tot de poeder is opgelost en de vloeistof helder is (dit kan 5 min duren).
- Drink iedere 15 minuten 1 glas van de klaargemaakte vloeistof.

Rond 08.00 uur (zodra de tweede verpakking Moviprep® op is) neemt u nog 2 tabletten Bisacodyl® met een slokje water. Vanaf nu blijft u nuchter, u mag dus ook niets meer drinken!

Colonoscopie in de middag:

Volg de voorbereidingen op deze pagina.

De dag vóór het onderzoek, te wetendag:

Wij verzoeken u na de lunch alleen yoghurt, vla en bouillon te gebruiken. Ook mag u koffie, thee en koolzuurhoudend bronwater gebruiken; echter geen vruchtensappen of andere suiker-dan wel gesuikerde koolzuurhoudende dranken.

Om 16.00 uur neemt u 2 tabletjes Bisacodyl® in.

Houdt u er rekening mee dat Bisacodyl® een laxerend middel is!

Om 20:00 uur opent u de verpakking van de MoviPrep® en neemt u sachet A en B eruit.

- Voeg nu de inhoud van sachet A en B samen in een maatbeker van 1 liter.
- Giet vervolgens 1 liter water in de maatbeker en roer tot de poeder is opgelost en de vloeistof helder is (dit kan 5 minuten duren).
- Drink iedere 15 minuten 1 glas van de klaargemaakte vloeistof.

Het is belangrijk dat u de rest van de avond veel drinkt, echter alleen heldere en suikervrije vloeistoffen, bijv. mineraalwater (minimaal 0,5 liter extra, aanvullend op de MoviPrep® oplossing).

De dag van het onderzoek, te wetendag:

Op de dag van het onderzoek mag u niets meer eten.

Om 08:00 uur maakt u op dezelfde wijze de tweede liter Moviprep® klaar en drinkt u iedere 15 minuten een glas. Drink daarbij nog extra water, minimaal 0,5 liter.

Om 11:00 uur neemt u alleen nog 2 tabletten Bisacodyl met een slokje water. Vanaf nu mag u ook niets meer drinken.

Waar meldt u zich op de dag van het onderzoek?

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van DC|Skoop Schiedam. Nadat u zich hier heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer waar u door één van de assistenten wordt opgehaald.

Het onderzoek

Voor het onderzoek begint, wordt u op een brancard gelegd. U ligt op uw linkerkant. Vervolgens krijgt u een infuusnaaldje in uw arm. Daarna wordt u aangesloten op een bloeddruk- en hartslagmeter. Gedurende het onderzoek krijgt u extra zuurstof. Via het infuusnaaldje krijgt u het slaapmiddel toegediend. Meestal ondervindt u van het onderzoek dan geen hinder.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 20 minuten. De endoscoop wordt voorzichtig via uw anus in uw dikke darm gebracht. De beelden worden op een scherm weergegeven waardoor de arts bepaalde afwijkingen meteen kan zien. Soms wordt bij dit onderzoek gelijktijdig ook een behandeling toegepast, bijvoorbeeld het verwijderen van eventueel aanwezige poliepen. De meeste van deze extra behandelingen zijn echter niet pijnlijk.

Zijn er risico's aan het onderzoek verbonden?

Complicaties van het onderzoek zelf komen eigenlijk zelden of nooit voor. Wanneer tijdens het onderzoek een behandeling wordt toegepast, bijvoorbeeld als één of meerdere poliepen worden verwijderd, neemt ook het risico op complicaties toe. De kans bestaat dat na deze ingreep een nabloeding of een gaatje ontstaat. Het kan dan voorkomen dat u opgenomen wordt voor een aanvullende behandeling. Soms moet er zelfs operatief worden ingegrepen.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar de dagverpleging gebracht om weer volledig wakker te worden. U krijgt hier een lichte maaltijd geserveerd.

Tussen 11.30 en 12.00 uur (bij een colonoscopie in de ochtend) of tussen 15.30 en 16.00 uur (bij een colonoscopie in de middag) bent u voldoende wakker om door iemand te worden opgehaald.

Het is niet toegestaan zonder begeleiding de afdeling te verlaten, omdat uw reactie- en denkvermogen tijdelijk minder is.

De uitslag

Voordat u de afdeling verlaat, komt de maag-darm-leverarts nog bij u langs. Deze geeft u kort de uitslag van het onderzoek. De consequenties van de uitslag en eventuele behandeling bespreekt u op een later tijdstip met de arts (huisarts of specialist) die het onderzoek heeft aangevraagd; hij/zij ontvangt de uitslag van het onderzoek.

Complicaties

Indien er na het onderzoek buikpijn optreedt of er bloedverlies via de anus dient U direct (ook 's nachts), contact op te nemen met de spoedeisende hulp (SEH) van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel, Prins Constantijnweg 2.

Telefoon: (010) 258 5000 of het algemene nummer van het Ziekenhuis: (010) 258 5000.

Uw afspraak

Nadat u een verwijzing heeft gekregen kunt u ons bellen voor een afspraak; telefoon 0800 - 231 3557 (gratis) of (010) 449 3280. In verband met het afsprakenprogramma verzoeken wij u vriendelijk 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn. Meldt u bij de balie met uw aanvraagformulier, verzekeringspasje en identiteitsbewijs. Mocht u een afspraak niet na kunnen komen zegt u deze dan minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening van 40 euro.

Vragen

Heeft u nog vragen, stelt u die dan gerust. U kunt tussen 8.30 uur en 16.30 uur altijd even bellen, tel. (010) 217 6900.

Tot slot

Wij doen er alles aan uw bezoek aan DC|Skoop Schiedam zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij dat graag.


Wanneer u een klacht heeft kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris, tel. (070) 330 1209. Hij/ Zij vraagt wat u wilt dat er met uw klacht gebeurt. Dat kan een bemiddelingsgesprek inhouden of het vragen van een reactie van de persoon op wie uw klacht betrekking heeft. U kunt ook besluiten uw klacht door de klachtencommissie te laten behandelen. De klachtenfunctionaris kan u over elk van deze stappen verder informeren.

Bus

Lijn 51 en 85 (halte Prinses Beatrixlaan)
Lijn 424 (Laan van Bol'es)

Tram

Lijn 21 (Prinses Beatrixlaan)
Lijn 23 (Prinses Beatrixlaan)



Diagnostisch Centrum Skoop Schiedam

Laan van Bol'es 3d
3122 AE Schiedam
tel. (010) 449 32 80
fax (010) 449 32 99

Buiten kantooruren:
IJsseland Ziekenhuis
Dienstdoende ass. interne geneeskunde
of spoedeisende hulp
tel. (010) 258 5000

schiedam@diagnostischcentrum.com
www.diagnostischcentrum.com