

Patiëntinformatie

Gastroscoopie



Gastroscoopie

Bij dit onderzoek wordt het slijmvlies van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm van binnen bekeken met een buigzame, bestuurbare kijker, een zogenaamde endoscoop. Endo betekent 'van binnen' en scoop betekent 'kijker', vandaar 'endoscopie'. In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Uw afspraak

Nadat u een verwijzing heeft gekregen kunt u ons bellen voor een afspraak; telefoon 0800 2313557 (gratis) of (010) 449 3280. In verband met het afsprakenprogramma verzoeken wij u vriendelijk 10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn. Meldt u bij de balie met uw aanvraagformulier, verzekeringspasje en identiteitsbewijs. Mocht u een afspraak niet na kunnen komen zegt u deze dan minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt ontvangt u een rekening.

Endoscopie: hoe en waarom?

De endoscoop is een dunne flexibele slang. Aan het uiteinde van de slang zit een kleine videocamera waarmee het onderzoek op

een beeldscherm te volgen is. Ons centrum maakt gebruik van de nieuwste generatie ultradunne endoscopen. Het voordeel van een endoscopie is dat de arts bepaalde afwijkingen zoals ontstekingen, zweertjes, bloedinkjes en gezwellen direct kan zien. Het is ook mogelijk om via het instrument stukjes weefsel weg te nemen voor nader onderzoek (biopsie). Dit is niet pijnlijk en veroorzaakt geen bloedverlies. Daarnaast kunnen via de scoop foto's worden gemaakt, zodat men zo nodig achteraf nog eens rustig naar de beelden kan kijken.

Belangrijk

- Bij het maken van een afspraak graag vermelden of u diabetespatiënt bent.
- Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn stukjes weefsel weg te halen. Bloedverdunnende, ontstekingsremmende en pijnstillende medicijnen kunnen de kans op bloedingen vergroten en moeten bij voorkeur gedurende enkele dagen voor het onderzoek niet worden ingenomen. Uw behandelend arts zal u vertellen om welke medicijnen het gaat. Bij twijfel of vragen kunt u het beste met uw behandelend arts overleggen. Stop nooit op eigen initiatief met deze medicijnen.
- Als uw onderzoek in de ochtend is en u 's ochtends medicijnen moet gebruiken, vraag dan aan uw arts hoe u dit kunt aanpassen. Dit geldt speciaal voor diabetes patiënten.
- Tijdens het onderzoek is het prettig om gemakkelijk zittende kleding dragen. Dus geen knellende kledingstukken zoals een korset of step-in.

Vorbereiding op het onderzoek

De voorbereiding van het onderzoek begint de avond voorafgaand aan de endoscopie. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken, omdat voedsel in de maag het bekijken van de maagwand heel moeilijk maakt. Vanaf dit tijdstip dient u ook niet meer te roken. Indien het onderzoek 's middags plaatsvindt, mag u vóór 8.00 uur een licht ontbijt nuttigen. Dat wil zeggen: thee met beschuit of brood zonder korst.

De endoscopieverpleegkundige brengt een verdovende zalf aan op de scoop. Verder wordt met een spray de keel verdoofd. Hierdoor heeft u tijdens het onderzoek minder last van kokhalzen. Tevens wordt een drankje gegeven om schuimvorming in de maag tegen te gaan. Om het onderzoek niet te belemmeren en beschadigingen aan uw eventuele gebitsprothese te voorkomen moet u deze uitdoen. Als u een bril draagt is het prettig deze af te zetten. Tenslotte krijgt u een 'bijtring' in uw mond om zowel uw gebit als de scoop te beschermen. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan vóór het onderzoek. Schrijf ze eventueel op, dan kunt u niets vergeten. Tijdens het onderzoek is praten niet mogelijk.

Het onderzoek

Het is begrijpelijk dat veel mensen opzien tegen een onderzoek waarbij een slang ingeslikt moet worden. Natuurlijk is het onderzoek niet prettig, maar probeer te ontspannen en blijf rustig doorademen. Volg de instructies van de

assistent goed op. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op de onderzoekstafel. De arts of de assistent geeft u aanwijzingen om de scoop in te slikken en legt u uit wat er verder gaat gebeuren. Het instrument wordt voorzichtig door de mond naar binnen geschoven. Het inbrengen van de scoop kan een vervelend gevoel geven. Eenmaal op zijn plaats geeft het instrument bijna geen hinder meer. Uw ademhaling wordt door de scoop op geen enkele manier belemmerd. Tijdens het onderzoek wordt via de scoop lucht ingeblazen. Hierdoor kan een drukkend gevoel in de buik ontstaan. Het kan zijn dat u gedurende het onderzoek moet kokhalzen of moet boeren. U hoeft zich hier niet voor te schamen. Wanneer er wat slijm in uw mond komt zal de endoscopie-assistent dit wegzuigen.

U kunt het onderzoek volgen op de monitor.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal maar enkele minuten. Als de arts bepaalde ingrepen moet verrichten duurt het misschien wat langer. Inclusief de voorbereiding moet u rekenen op een duur van 15 minuten.

Na het onderzoek

- U kunt na het onderzoek weer normaal eten en drinken. Wanneer uw keel verdoofd is raden wij u aan hiermee te wachten tot een half uur na het onderzoek, omdat u zich gemakkelijk zou kunnen verslikken.
- Het kan zijn dat uw keel wat gevoelig is. Dit zakt vrij snel af.

- Misschien heeft u ook een opgeblazen gevoel door de lucht die tijdens het onderzoek in uw maag is geblazen. Opboeren of winden laten geeft dan verlichting.

Complicaties

Een gastroscopie is een veilig onderzoek. Een mogelijke complicatie is een perforatie (scheur) of een bloeding, maar dit komt zelden voor. Wanneer u na afloop heftige maagpijn of hoge koorts krijgt, moet u contact opnemen met de arts die de endoscopie heeft verricht. Alle endoscopieën in DC Skoop Schiedam worden verricht door maag-darm-leverartsen van het IJsselland Ziekenhuis. Tijdens kantooruren zijn de artsen te bereiken via DC Skoop Schiedam, tel. (010) 449 3280. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende MDL-arts van het IJsselland Ziekenhuis. Deze is te bereiken via de telefoon- centrale van het IJsselland Ziekenhuis, tel. (010) 258 5000, vraagt u naar de dienstdoende assistent interne geneeskunde. U kunt via dit nummer ook worden doorverbonden met de afdeling spoedeisende hulp.

De uitslag

Gewoonlijk zal de arts die het onderzoek verricht heeft, voordat u naar huis gaat zijn/haar bevindingen met u bespreken. Voor een definitieve uitslag moet eerst het resultaat van

weefselonderzoek in het laboratorium worden afgewacht; dat duurt 4 tot 6 werkdagen. De uitslag wordt doorgestuurd aan uw huisarts of specialist bij wie u onder behandeling bent. Hij of zij bespreekt de definitieve resultaten van het onderzoek en de eventuele behandeling met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. U vindt onze contactgegevens aan de achterzijde.

Tot slot

Wij doen er alles aan uw bezoek aan DC Skoop Schiedam zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u niet geheel tevreden bent horen wij dit graag. Heeft u vragen n.a.v. de folder of het onderzoek, stelt u die dan gerust. Wanneer u een klacht heeft kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris, tel. (070) 330 1209. Hij/zij vraagt wat u wilt dat er met uw klacht gebeurt. Dat kan een bemiddelingsgesprek inhouden of het vragen van een reactie van de persoon op wie uw klacht betrekking heeft. U kunt ook besluiten om uw klacht door de klachtencommissie te laten behandelen. De klachtenfunctionaris kan u over elk van deze stappen verder informeren.

Bus


Lijn 51 en 85 (halte Prinses Beatrixlaan)

Lijn 424 (Laan van Bol'es)

Tram

Lijn 21 (Prinses Beatrixlaan)

Lijn 23 (Prinses Beatrixlaan)



Diagnostisch Centrum Skoop Schiedam

Laan van Bol'es 3d

3122 AE Schiedam

tel. (010) 449 32 80

fax (010) 449 32 99

Buiten kantooruren:

IJsseland Ziekenhuis

Dienstdoende ass. interne geneeskunde

of spoedeisende hulp

tel. (010) 258 5000

schiedam@dc-groep.com

www.dc-groep.com